

TIPO DI INTERVENTO	PROFILASSI ANTIBIOTICA - INTERVENTO OFTALMICO	
	ANTIBIOTICO E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE (1° SCELTA)	NEI PAZIENTI ALLERGICI AI BETALATTAMICI (2° SCELTA)
VITRECTOMIA	CEFAZOLINA 2 gr e.v. in 100 ml di Soluzione fisiologica 30 minuti prima dell'inizio dell'intervento.	CIPROFLOXACINA 200mg/100ml 1 ora prima dell'inizio dell'intervento.
DACRIOCISTORINOSTOMIA	CEFAZOLINA 2 gr e.v. in 100 ml di Soluzione fisiologica 30 minuti prima dell'inizio dell'intervento.	Idem
DACRIOCISTECTOMIA	CEFAZOLINA 2 gr e.v. in 100 ml di Soluzione fisiologica 30 minuti prima dell'inizio dell'intervento.	Idem
DISTACCO DI RETINA	CEFAZOLINA 2 gr e.v. in 100 ml di Soluzione fisiologica 30 minuti prima dell'inizio dell'intervento.	Idem
STRABISMO	CEFAZOLINA 2 gr e.v. in 100 ml di Soluzione fisiologica 30 minuti prima dell'inizio dell'intervento.	Idem
SCAMBIO DI OLIO DI SILICONE	CEFAZOLINA 2 gr e.v. in 100 ml di Soluzione fisiologica 30 minuti prima dell'inizio dell'intervento.	Idem
ENUCLEAZIONE	CEFAZOLINA 2 gr e.v. in 100 ml di Soluzione fisiologica 30 minuti prima dell'inizio dell'intervento.	Idem
SCOPPIO DEL BULBO	CEFAZOLINA 2 gr e.v. in 100 ml di Soluzione fisiologica 30 minuti prima dell'inizio dell'intervento.	Idem
CORPO ESTRANEO ENDOBULBARE	CEFAZOLINA 2 gr e.v. in 100 ml di Soluzione fisiologica 30 minuti prima dell'inizio dell'intervento.	Idem
TRAUMA ENDOBULBARE	CEFAZOLINA 2 gr e.v. in 100 ml di Soluzione fisiologica 30 minuti prima dell'inizio dell'intervento.	Idem
VITRECTOMIA+ FACOEMULSIFICAZIONE (CATARATTA)	CEFAZOLINA 2 gr e.v. in 100 ml di Soluzione fisiologica 30 minuti prima dell'inizio dell'intervento; CEFUROXIME 1 mg in 0,1 ml di Soluzione Fisiologica, al termine dell'intervento.	Idem
TRAPIANTO DI CORNEA	CEFAZOLINA 2 gr e.v. in 100 ml di Soluzione fisiologica 30 minuti prima dell'inizio dell'intervento; a fine intervento sottocongiuntivale di GENTAMICINA 40 mg	Idem
FACOEMULSIFICAZIONE (CATARATTA)	Iniezione in Camera Anteriore di CEFUROXIME 1 mg in 0,1 ml di Soluzione Fisiologica, al termine dell'intervento.	Iniezione in Camera Anteriore di VANCOMICINA 500 mg in 0,1 ml di Sol. Fisiologica, al termine dell'intervento.
FISSAZIONE SCLERALE	Iniezione in Camera Anteriore di CEFUROXIME 1 mg in 0,1 ml di Soluzione Fisiologica, al termine dell'intervento.	Idem

TRABECULECTOMIA (GLAUCOMA) + FACOEMULSIFICAZIONE (CATARATTA)	Iniezione in Camera Anteriore di CEFUROXIME 1 mg in 0,1 ml di Soluzione Fisiologica, al termine dell'intervento.	Idem
TRABECULECTOMIA (GLAUCOMA)	Iniezione in Camera Anteriore di CEFUROXIME 1 mg in 0,1 ml di Soluzione Fisiologica, al termine dell'intervento, iniezione sottocongiuntivale di GENTAMICINA 40 mg	Idem
INTRAVITREALE	LEVOFLOXACINA 0,3% collirio 1 gtt x 4 nei 6 giorni precedenti l'intervento, e nei 4 giorni successivi.	Idem
CHIRURGIA PLASTICA	TOBRAMICINA E DESAMETASONE 0,3% + 0,1% collirio / unguento 1 x 3 nei 6 giorni successivi all'intervento.	Idem
CHIRURGIA REFRAATTIVA	NETILMICINA o LEVOFLOXACINA 0,3% collirio 1 x 4 nei 7 giorni successivi all'intervento.	Idem
ENDOSCOPIA VIE LACRIMALI	CIPROFLOXACINA 500 mg compresse alla dimissione 1 x 2 per 7 giorni	Idem
SONDAGGIO VIE LACRIMALI	CIPROFLOXACINA 500 mg compresse alla dimissione 1 x 2 per 7 giorni	Idem
KROSS LINKING / IONTOFORESI	Nessuna profilassi	
Note	Nella somministrazione dell'antibiotico profilassi va sempre tenuto conto di eventuali allergie o "sensibilità" riferite dal paziente. <i>Per la profilassi antibiotica in pazienti portatori di protesi o materiale protesico extracardiaco e la profilassi antibiotica dell'endocardite batterica per le quali si fa riferimento alla LG n. 17 del SNLG "Antibiotico profilassi perioperatoria nell'adulto" (Allegato 2 e Allegato 3).</i>	