

TIPO DI INTERVENTO	PROFILASSI ANTIBIOTICA - UROLOGIA		NOTE
	ANTIBIOTICO E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE (1° SCELTA)	NEI PAZIENTI ALLERGICI AI BETALATTAMICI (2° SCELTA)	
INTERVENTI SUL TESTICOLO - Idrocele - Varicocele - Orchidopessi - Orchiectomia ALTRI INTERVENTI - Cisti dell'epididimo - Fimosi	Di norma: nessuna profilassi antibiotica Se il punteggio ASA è ≥ 3, somministrare: - una cefalosporina di 1° generazione (cefazolina 2 g) oppure - una cefalosporina di 2° generazione (1° dose: cefuroxima 2 g)	Di norma: nessuna profilassi antibiotica Se lo si ritiene fortemente necessario, somministrare un antibiotico non betalattamico con spettro adeguato, ad esempio: - clindamicina[^] (600 mg) oppure - un fluorochinolone (ad esempio ciprofloxacina[^] 400 mg)	[^] farmaco che non presenta in scheda tecnica l'indicazione di profilassi antibiotica in chirurgia ^o le aminopenicilline associate ad un inibitore delle betalattamasi sono tra gli antibiotici più frequentemente utilizzati in terapia, il loro uso in profilassi deve essere quindi limitato e valutato caso per caso
INTERVENTI SUL RENE - Nefrotomia - Nefrostomia - Nefrectomia INTERVENTI PER CALCOLOSI - Litotrixxia con onde d'urto	Somministrare: - una cefalosporina di 1° generazione (cefazolina 2 g) oppure - una cefalosporina di 2° generazione (cefuroxima 2 g) - dose intraoperatoria per interventi con durata superiore a 3 ore	Di norma: nessuna profilassi antibiotica Se lo si ritiene fortemente necessario, somministrare un antibiotico non betalattamico con spettro adeguato, ad esempio: - clindamicina[^] (600 mg) oppure - un fluorochinolone (ad esempio ciprofloxacina[^] 400 mg)	
DIAGNOSTICA UROLOGICA Agobiopsia prostatica transrettale	Somministrare: - cefotitina[^] 2 g come 2° scelta - aminopenicillina associata ad un inibitore delle betalattamasi [amoxicillina/ac. clavulanico 1 g per os due ore prima di iniziare la procedura]^o	Somministrare un antibiotico non betalattamico con spettro adeguato, ad esempio: - clindamicina[^] (600 mg) $\pm$ gentamicina[^] 3 mg/Kg NB: la dose di gentamicina non va ripetuta oppure - un fluorochinolone (ad esempio ciprofloxacina[^] 400 mg)	Per la profilassi antibiotica in pazienti portatori di protesi o materiale protesico extracardiaco e la profilassi antibiotica dell'endocardite batterica per le quali si fa riferimento alla LG n. 17 del SNLG "Antibiotico profilassi perioperatoria nell'adulto" (Allegato 2 e Allegato 3).
INTERVENTI SULLA PROSTATA - Resezione trans uretrale di prostata (TUR-P) - Adenomectomia trans vescicale (ATV) - Prostatectomia radicale INTERVENTI SULL'URETERE - Interventi sulla via	Antibiotico e modalità di somministrazione Somministrare: una cefalosporina (cefotitina[^] 2 g, cefuroxima 2 g) se l'urinocoltura è negativa NB: Escludere sempre, prima dell'intervento, l'eventuale presenza di colonizzazione/infezione e in caso positivo eradicare	Somministrare un antibiotico non betalattamico con spettro adeguato, ad esempio: - clindamicina[^] (600 mg) $\pm$ gentamicina[^] 3 mg/Kg NB: la dose di gentamicina non va ripetuta oppure - un fluorochinolone (ad esempio ciprofloxacina[^] 400 mg)	

escretrice superiore • Pieloplastiche INTERVENTI SULL'URETRA • Uretrotomia endoscopica INTERVENTI SULLA VESCICA • Resezione transuretrale di tumori vescicali • Altri interventi sulla vescica	l'infezione prima di eseguire l'intervento • dose intraoperatoria per interventi con durata superiore a 3 ore		
INTERVENTI SULLA VESCICA • Cistectomia con apertura dell'intestino	1) Preparazione intestinale 2) Somministrare: • un aminoglicoside [gentamicina[^] 3 mg/Kg (NB: la dose non va ripetuta)] in associazione con clindamicina[^] 600 mg o metronidazolo 500 mg come 2° scelta • ureidopenicillina (ad esempio piperacillina 4 g) <i>oppure</i> • aminopenicillina associata ad un inibitore delle Betalattamasi [amoxicillina/ac. clavulanico 2,2 g (1,2 g se peso <50 Kg) da infondere in 30 minuti][°] • dose intraoperatoria per interventi con durata superiore a 3 ore	Somministrare un antibiotico, scegliendo fra gli schemi indicati nella cella di lato, quelli privi del betalattamico	